

---

# CONCOURS COMMUN 2006

## DES ÉCOLES DES MINES D'ALBI, ALÈS, DOUAI, NANTES

---

### Épreuve de Mathématiques

(toutes filières)

**Jeudi 11 mai 2006 de 14h00 à 18h00**

#### **Instructions générales :**

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Les candidats colleront sur leur première feuille de composition l'étiquette à code à barres correspondante.

### L'emploi d'une calculatrice est interdit

### PREMIER PROBLÈME

$\mathbb{R}$  désigne l'ensemble des nombres réels. On notera  $M_2(\mathbb{R})$  l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels. On rappelle que  $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et  $\times$  désigne la multiplication des matrices.

$\mathbb{C}$  désigne l'ensemble des complexes. On notera  $|z|$  le module d'un complexe  $z$ .

Les différentes parties de ce problème ont un lien entre elles mais peuvent être traitées séparément.

#### **Étude d'une fonction.**

Soit  $f$  la fonction qui à un complexe  $z$  associe, lorsque c'est possible,  $f(z) = \frac{z^2}{z - 2i}$ .

1. Déterminer le domaine de définition  $D$  de  $f$
2. **a.** Déterminer les racines carrées complexes de  $8 - 6i$ .  
**b.** En déduire tous les antécédents de  $1 + i$  par  $f$ .
3. Soit  $h$  un complexe. Discuter suivant les valeurs de  $h$  le nombre d'antécédents de  $h$  par  $f$ .
4. Déterminer l'image  $f(D)$  de  $D$  par  $f$ . La fonction  $f$  est-elle une application surjective de  $D$  dans  $\mathbb{C}$  ?
5.  $f$  est-elle une application injective de  $D$  dans  $\mathbb{C}$  ?

Soit  $g$  l'application définie sur  $D$  à valeur dans  $\mathbb{C}$  et telle que :

$$\forall z \in D, g(z) = |z - 2i|^2 \frac{z^2}{z - 2i} + z^3$$

6. Soit  $z$  un complexe appartenant à  $D$  de partie réelle  $x$  et de partie imaginaire  $y$ . Trouver la partie réelle et la partie imaginaire de  $g(z)$ . Montrer en particulier que la partie réelle de  $g(z)$  est :  $2x^3 - 2xy^2 - 4xy$ .

Soit le plan  $P$  rapporté à un repère orthonormé direct  $R(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ . Soit  $\Gamma$  l'ensemble des points  $M$  du plan d'affixe  $z$  tels que  $g(z)$  est un imaginaire pur.

7. Montrer que  $\Gamma$  est inclus dans la réunion d'une droite  $\Delta$  et d'une conique  $C$ . Préciser  $\Gamma$ .  
8. Déterminer la nature de  $C$ . Préciser le centre et les axes de  $C$ . Déterminer l'excentricité de  $C$  ainsi que les coordonnées de ses foyers dans le repère  $R$ .

### Étude d'un polynôme.

Soit  $a$  un entier naturel. Soit  $P_a$  la fonction polynôme définie sur  $\mathbb{R}$  par :  
 $\forall t \in \mathbb{R}, P_a(t) = t^3 - t(a^2 + 2a) + 2$ .

Le but de cette partie est de trouver  $a$  tel que  $P_a$  possède trois racines dans  $\mathbb{Z}$ .

On suppose que  $a$  existe. Soient  $t_1, t_2, t_3$  les 3 racines de  $P_a$  avec  $t_1 \leq t_2 \leq t_3$ .

9. Que valent  $t_1 + t_2 + t_3$  et  $t_1 t_2 t_3$ ?  
10. Calculer  $P_a(0)$  et en déduire que  $t_1 < 0$ .  
11. Déduire du 9. et du 10. que  $t_1 \leq 0 \leq t_2 \leq t_3 \leq -t_1$  puis les valeurs de  $t_1, t_2, t_3$ .  
12. Montrer que  $P'_a(t_2) = 0$ . En déduire la valeur de  $a$ .  
13. Réciproquement, montrer que la valeur de  $a$  ainsi trouvée convient bien.

### Étude de deux ensembles de matrices.

Soit  $(x, y)$  un élément quelconque de  $\mathbb{R}^2$ . On note  $M_{x,y}$  la matrice  $\begin{pmatrix} x-y & y \\ 2 & x+y \end{pmatrix}$ .

Soit  $\Sigma$  le sous-ensemble de  $M_2(\mathbb{R})$  tel que  $\Sigma = \{ M_{x,y}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \}$ .

14. Quelle relation doivent vérifier  $x$  et  $y$  pour que la matrice  $M_{x,y}$  ne soit pas inversible ?

Calculer le produit  $M_{x,y} \times M_{-x,y}$ . En déduire l'inverse de  $M_{x,y}$  lorsqu'il existe.

15.  $\Sigma$  est-il un sous-espace vectoriel de  $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$  ? On justifiera sa réponse.

Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$  et  $J = \{ A + M_{x,y}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \}$ .

16. Montrer que  $J$  est un sous-espace vectoriel de  $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ .  
17. Quelle est la dimension de  $J$  ? Déterminer une base de  $J$ .  
18. Montrer que la loi  $\times$  est interne dans  $J$ .

### Étude d'une application de $M_2(\mathbb{R})$ .

Soit  $B$  une matrice quelconque de  $M_2(\mathbb{R})$ . Soit  $\varphi_B$  l'application de  $M_2(\mathbb{R})$  dans  $M_2(\mathbb{R})$  qui à la matrice  $X$  associe la matrice  $\varphi_B(X) = B \times X$ .

19. Montrer que  $\varphi_B$  est un endomorphisme de l'espace vectoriel  $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ .

20. On suppose dans cette question que  $B = M_{2,1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ .

**20.a**  $\varphi_B$  est elle surjective ? Bijective ?

**20.b** . Déterminer la matrice de  $\varphi_B$  dans la base canonique de  $M_2(\mathbb{R})$ .

On rappelle que la base canonique de  $M_2(\mathbb{R})$  est constituée des matrices

$$(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2}) \text{ où } E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } E_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**21.** On prend dans cette question  $B = M_{0,-2} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ .  $\varphi_B$  est elle surjective ? Bijective ?

## DEUXIÈME PROBLÈME.

Soit  $n$  un entier naturel. Si  $n$  est non nul, on note  $f_n$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  qui associe à un réel

$x$  lorsque c'est possible  $f_n(x) = \frac{\sin x}{2 - \cos x} - \frac{x}{n}$ . On note  $f_0$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  qui associe à

un réel  $x$  lorsque c'est possible  $f_0(x) = \frac{\sin x}{2 - \cos x}$ .

### Généralités sur $f_n$ .

Soit  $n$  un entier naturel fixé.

1. Déterminer le domaine de définition  $D$  de  $f_n$ .
2.  $f_n$  est-elle paire ?  $f_n$  est-elle impaire ? On justifiera sa réponse.
3.  $f_n$  est-elle  $2\pi$ -périodique ?
4. Montrer qu'il suffit d'étudier  $f_n$  sur  $[0, \pi]$  pour tracer sa courbe sur  $D$  tout entier. On justifiera sa réponse.

### Étude de la fonction $f_0$ .

5. Étudier la dérivabilité de  $f_0$  sur  $D$ . Déterminer l'expression de sa dérivée.
6. Étudier le signe de la dérivée de  $f_0$  sur  $[0, \pi]$ .
7. Déterminer le tableau de variations sur  $[0, \pi]$  et tracer l'allure de la courbe de  $f_0$  sur  $\mathbb{R}$  dans le plan rapporté à un repère orthonormé.  
On rappelle que :  $\sqrt{3}$  a pour valeur 1,732 comme valeur approchée par défaut à  $10^{-3}$  près.
8. Déterminer les valeurs maximales et minimales atteintes par  $f_0(x)$  quand  $x$  parcourt  $\mathbb{R}$ . En déduire la valeur maximale atteinte par  $|f_0(x)|$  lorsque  $x$  parcourt  $\mathbb{R}$ .

### Utilisation d'une primitive de $f_0$ .

9. Déterminer une primitive de  $f_0$  sur  $\mathbb{R}$ . En déduire  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin t}{2 - \cos t} dt$ .

Soit l'équation différentielle (E) :  $y'(x) + \frac{\sin x}{2 - \cos x} y(x) = 2 \sin x$ .

10. Résoudre sur  $\mathbb{R}$  l'équation sans second membre (H) associée à (E).
11. Chercher une solution particulière de (E) sous la forme  $x \mapsto a \cos(x) + b$  avec  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ .  
Résoudre (E) sur  $\mathbb{R}$ .
12. Trouver la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$ , solution de (E) et qui vérifie :  $h(0) = 1$ .

**Étude d'une courbe polaire.**

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct  $\mathfrak{R}(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Soit  $\Gamma$  la courbe définie par l'équation polaire :  $\rho = \frac{\sin \theta}{2 - \cos \theta}$ . Pour tout réel  $\theta$  on notera  $\vec{u}_\theta$  le vecteur  $\vec{u}_\theta = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$  et

$M(\theta)$  le point du plan tel que  $\overrightarrow{OM(\theta)} = \frac{\sin \theta}{2 - \cos \theta} \vec{u}_\theta$ .

13. Soit un élément  $\theta$  de  $D$ . Montrer qu'il existe une symétrie  $s$  telle que  $s(M(\theta)) = M(-\theta)$ .

14. Déterminer une équation cartésienne de la tangente à  $\Gamma$  au point  $M(\frac{\pi}{2})$ .

15. Tracer l'allure de la courbe  $\Gamma$ .

**Étude de la fonction**  $g : x \mapsto \frac{\sin x}{x(2 - \cos x)}$ .

16. Déterminer le domaine de définition de  $g$ .

17. Montrer que  $g$  admet une limite finie  $l$  en 0.

On prolonge  $g$  par continuité en posant :  $g(0) = l$ .

18. Déterminer le développement limité en 0 d'ordre 3 de  $g$  ainsi prolongée.

19. Montrer que  $g$  est dérivable en 0 et déterminer  $g'(0)$ .

On admet que  $g$  est dérivable sur  $]0, \pi]$  et que pour tout  $x$  de  $]0, \pi]$ ,  $g'(x)$  est strictement négatif.

20. Montrer que  $g$  est une bijection entre  $[0, \pi]$  et un ensemble  $I$  à définir. On notera  $h$  sa réciproque.

**Étude d'une suite qui annule**  $f_n$ .

Soit  $n$  un entier naturel non nul.

21. Montrer que si  $a$  est un réel strictement positif qui annule  $f_n$ , alors  $a$  appartient à l'intervalle  $[0, n\sqrt{3}]$ .

22. Montrer qu'il existe un unique réel  $x_n$  appartenant à  $[0, \pi]$  tel que  $f_n(x_n) = 0$ .

23. Montrer que la suite  $(x_n)$  est convergente et déterminer sa limite.

**FIN DE L'ÉPREUVE**