

---

**ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE****ANNÉE 2008****CONCOURS DE RECRUTEMENT  
D'ÉLÈVES PILOTE DE LIGNE**

---

**ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES**

---

**Durée : 2 Heures  
Coefficient : 1**

Ce sujet comporte :

- 1 page de garde,
- 2 pages (recto-verso) d'instructions pour remplir le QCM,
- 10 pages de texte numérotées de 1 à 10.

**CALCULATRICE AUTORISÉE**

## ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

### A LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT

L'épreuve de mathématiques de ce concours est un questionnaire à choix multiple qui sera corrigé automatiquement par une machine à lecture optique.


### ATTENTION, IL NE VOUS EST DÉLIVRÉ QU'UN SEUL QCM

- 1) Vous devez coller dans la partie droite prévue à cet effet, l'étiquette correspondant à l'épreuve que vous passez, c'est-à-dire épreuve de mathématiques (voir modèle ci-dessous).

### POSITIONNEMENT DES ÉTIQUETTES

Pour permettre la lecture optique de l'étiquette, le trait vertical matérialisant l'axe de lecture du code à barres (en haut à droite de votre QCM) doit traverser la totalité des barres de ce code.

EXEMPLES :



- 2) Pour remplir ce QCM, vous devez utiliser un STYLO BILLE ou une POINTE FEUTRE de couleur NOIRE.
- 3) Utilisez le sujet comme brouillon et ne retranscrivez vos réponses qu'après vous être relu soigneusement.
- 4) Votre QCM ne doit pas être souillé, froissé, plié, écorné ou porter des inscriptions superflues, sous peine d'être rejeté par la machine et de ne pas être corrigé.

- 5) Cette épreuve comporte 36 questions, certaines, de numéros consécutifs, sont liées. La liste des questions liées est donnée au début du texte du sujet.

**Chaque candidat devra choisir au plus 24 questions parmi les 36 proposées.**

Il est inutile de répondre à plus de 24 questions : la machine à lecture optique lira les réponses en séquence en partant de la ligne 1, et s'arrêtera de lire lorsqu'elle aura détecté des réponses à 24 questions, quelle que soit la valeur de ces réponses.

**Chaque question comporte au plus deux réponses exactes.**

- 6) A chaque question numérotée entre 1 et 36, correspond sur la feuille-réponses une ligne de cases qui porte le même numéro (les lignes de 37 à 100 sont neutralisées). Chaque ligne comporte 5 cases A, B, C, D, E.

Pour chaque ligne numérotée de 1 à 36, vous vous trouvez en face de 4 possibilités :

- ▶ soit vous décidez de ne pas traiter cette question, *la ligne correspondante doit rester vierge.*
- ▶ soit vous jugez que la question comporte une seule bonne réponse, *vous devez noircir l'une des cases A, B, C, D.*
- ▶ soit vous jugez que la question comporte deux réponses exactes, *vous devez noircir deux des cases A, B, C, D et deux seulement.*
- ▶ soit vous jugez qu'aucune des réponses proposées A, B, C, D n'est bonne, *vous devez alors noircir la case E.*

**En cas de réponse fautive, aucune pénalité ne sera appliquée.**

#### 7) EXEMPLES DE RÉPONSES

Question 1 :  $1^2 + 2^2$  vaut :

A) 3   B) 5   C) 4   D) -1

Question 2 : le produit  $(-1)(-3)$  vaut :

A) -3   B) -1   C) 4   D) 0

Question 3 : Une racine de l'équation  $x^2 - 1 = 0$  est :

A) 1   B) 0   C) -1   D) 2

**Vous marquerez sur la feuille réponse :**

1	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>

## EPL Mathématiques

1) Dans les assertions suivantes lesquelles sont vraies?

a)  $\forall \theta \in IR, \cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta + 5 \cos \theta$

b)  $\forall \theta \in IR, \cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$

c)  $\cos \frac{\pi}{10} = \sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}$

d)  $\cos \frac{\pi}{10} = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}$  car  $\cos \frac{\pi}{10} \leq \cos \frac{\pi}{3}$

2) Soit le plan rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . On considère alors les points  $I(1, 2)$ ,  $M = (2, 3)$  et  $M'(\sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$ .

La similitude de centre  $I$  qui transforme  $M$  en  $M'$  est alors:

a) de rapport 2

b) d'angle  $\frac{\pi}{4}$

c) de rapport  $\frac{1}{2}$

d) d'angle  $\frac{\pi}{3}$

3) Soit  $n \in IN^*$ , on cherche à résoudre  $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \cos(2k\theta) = 0$  où  $\theta$  est une inconnue réelle

a) Si  $\theta$  est solution alors  $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \sin^2(k\theta) = 2^n$

b)  $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \cos(2k\theta) = \cos(n\theta) \left(\frac{\cos\theta}{2}\right)^n$

c) L'ensemble des solutions est  $\left\{\frac{\pi}{n} + \frac{k\pi}{n}, k \in Z\right\} \cup \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z\right\}$

d) Il n'y a pas de solution à cette équation

4) On considère l'application  $f$  qui à tout complexe  $z \neq i$  associe  $f(z) = \frac{z+i}{z-i}$ .

On note  $U = \{z \in C, |z| = 1\}$  et  $iIR = \{z \in C, \text{Re}(z) = 0\}$

a)  $f$  est une bijection de  $C \setminus \{i\}$  dans  $C$

b)  $f(iR) = U$

c)  $f(U) = iIR \setminus \{i\}$

d)  $f(iIR) = iR$

5) On cherche le lieu des points d'affixe  $z$  tels que  $z, z^2$  et  $z^5$  soit les affixes de trois points alignés. On note  $H$  cet ensemble de points et  $H_c$  l'ensemble de leurs affixes.

- a)  $z \in H_c \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$  ou  $z^3 + z^2 + z$  est imaginaire pur
- b)  $\text{Im}(z^3 + z^2 + z) = 3(\text{Re}(z))^2 - (\text{Im}(z))^2 + 2\text{Re}(z) + 1$
- c)  $H$  est une hyperbole équilatère centrée en  $(-\frac{1}{3}, 0)$  de grand axe parallèle à l'axe des imaginaires, de demi grand axe  $\sqrt{\frac{2}{3}}$
- d)  $H$  contient une hyperbole centrée en  $(-\frac{1}{3}, 0)$  de grand axe parallèle à l'axe des imaginaires, de demi grand axe  $\sqrt{\frac{2}{3}}$  et dont les asymptotes ont comme coefficients directeurs  $\sqrt{3}$  et  $-\sqrt{3}$

6) On considère les suites  $(u_n)_{n \geq 2}$  et  $(v_n)_{n \geq 2}$  définie par:

$$\forall n \geq 2, u_n = \prod_{k=2}^n \cos \frac{\pi}{2^k} \text{ et } v_n = u_n \sin \frac{\pi}{2^n}$$

- a)  $(u_n)_{n \geq 2}$  est croissante et majorée par 1. Elle converge donc.
- b)  $(v_n)_{n \geq 2}$  est une suite géométrique de raison  $\frac{1}{2}$
- c)  $(u_n)_{n \geq 2}$  et  $(v_n)_{n \geq 2}$  sont adjacentes
- d)  $(u_n)_{n \geq 2}$  converge vers  $\frac{1}{2}$

#### Attention: questions 7 et 8 liées

7) Soit la fonction réelle  $f$  de la variable réelle  $t$  définie par:

$$\forall t > 0, f(t) = \ln(1+t) + \frac{t^2}{1+t^2}$$

- a)  $f$  est indéfiniment dérivable sur son ensemble de définition, croissante et concave.
- b) La courbe représentative de  $f$  admet une asymptote oblique en  $+\infty$  car  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{t} = 1$
- c)  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}^+$  sur  $\mathbb{R}^+$  et sa bijection réciproque est dérivable sur  $\mathbb{R}^+$  car  $\forall t > 0, f'(t) \neq 0$
- d)  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}^+$  sur  $\mathbb{R}^+$  et sa bijection réciproque est dérivable sur  $\mathbb{R}^+$  car toute bijection dérivable admet une réciproque dérivable

8) En utilisant  $f$  définie en question 7), on peut montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists ! a_n, f(a_n) = \frac{1}{n}$$

- a)  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite croissante car  $f^{-1}$  est décroissante et  $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$  est décroissante

- b)  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge vers 0 puisque  $f^{-1}$  est continue en 0  
 c)  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge vers 0 puisque  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite décroissante  
 et  $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n \geq 0$   
 d)  $a_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$

9) On suppose que  $f$  est une fonction continue sur  $\mathbb{R}$  admettant une limite finie  $\ell$  en  $+\infty$  et  $a$  est un réel strictement positif.

a)  $y \rightarrow \int_0^y f(t) dt$  est continue sur  $[y, y+a]$  et dérivable sur  $]y, y+a[$ ,  $\forall y \in \mathbb{R}$

$$b) \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_y^{y+a} f(t) dt = a\ell$$

$$c) \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X f(t+a) - f(t) dt = \int_0^a f(t) dt + a\ell$$

$$d) \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X \arctan(t+1) - \arctan t dt = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4}$$

10) On cherche à comparer  $e^x$  avec son développement limité:

$$a) \exists \theta \in ]0, 1[, \forall n \in \mathbb{N}, e^x = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{x^k}{k!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\theta x}$$

$$b) \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, e^x \geq \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{x^k}{k!}$$

$$c) \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, e^x \geq \sum_{k=0}^{2n} \frac{x^k}{k!}$$

$$d) \forall x \in \mathbb{R}^-, \forall n \in \mathbb{N}, e^x \leq \sum_{k=0}^{2n} \frac{x^k}{k!}$$

11) Soit  $a$  et  $b$  deux fonctions réelles à valeurs strictement positives de la variable réelle  $x$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$  tels que  $a(x) \underset{\alpha}{\sim} b(x)$

a) Il existe une fonction  $\epsilon$  définie sur un voisinage de  $\alpha$  avec  $\lim_{x \rightarrow \alpha} \epsilon(x) = 0$   
 et  $\ln(a(x)) = \ln(b(x)) + \ln(1 + \epsilon(x))$

$$b) \ln(a(x)) \underset{\alpha}{\sim} \ln(b(x))$$

$$c) \ln\left(1 + \frac{x}{2} + \sin^2 x\right) \underset{0}{\sim} \ln(1+x) \text{ car } 1 + \frac{x}{2} + \sin^2 x \underset{0}{\sim} 1+x$$

$$d) \ln(|\sin x|) \underset{0}{\sim} \ln(|x|) \text{ car } |\sin x| \underset{0}{\sim} |x| \text{ et que } |x| \neq 1 \text{ sur un voisinage de } 0$$

12) Quelques limites en utilisant des équivalents:

a) Pour  $\beta \neq 0$  et  $\alpha$  réels  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos \alpha x}{\ln \cos \beta x} = -\frac{\alpha^2}{\beta^2}$

b) Pour  $\beta \neq 0$  et  $\alpha$  réels  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos \alpha x}{\ln \cos \beta x} = \frac{\alpha^2}{\beta^2}$

c)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \left( \operatorname{tg} \frac{3x}{2} \right)^{\operatorname{tg}(3x)} = e^{-1}$

d)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \left( \operatorname{tg} \frac{3x}{2} \right)^{\operatorname{tg}(3x)} = e$

13) Soit la fonction réelle  $f$  de la variable réelle  $x$  définie par:

$$\forall x \neq 0, f(x) = e^{\frac{x-1}{x^2}} \text{ et } f(0) = 0$$

a)  $f$  est continue sur  $IR$ , dérivable sur  $IR^*$ , non dérivable en 0

b)  $\forall x \in IR^*, f'(x) = \frac{2-x}{x^3} e^{\frac{x-1}{x}}$

c) Sur  $[1, +\infty[$ ,  $f$  ne possède qu'un extremum en 2, puisque  $f'(x) = 0 \implies x = 2$

d)  $f(x) = x$  admet deux et seulement deux solutions sur  $IR$  car la droite d'équation  $y = x$  est tangente à la courbe représentative de  $f$

14) Soit la fonction réelle  $f$  de la variable réelle  $x$  définie par

$$f(x) = e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x(x+2)}$$

a) Aux voisinages de  $+\infty$  et  $-\infty$  on a  $\sqrt{x(x+2)} = x \left( 1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$

b) En  $+\infty$ , la courbe représentative de  $f$  admet la droite d'équation  $y = x + 2$  comme asymptote

c) En  $-\infty$ , la courbe représentative de  $f$  admet la droite d'équation  $y = x + 2$  comme asymptote

d) En  $-\infty$ , la courbe représentative de  $f$  admet la droite d'équation  $y = x + 2$  comme asymptote et la courbe est au dessus de son asymptote.

15) Si  $f$  est une fonction continue sur un intervalle réel  $[a, b]$  ( $a < b$ )

a)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t) dt$

b)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t) dt$

c)  $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (n+k)} = n e^{\sum_{k=1}^n \ln\left(1+\frac{k}{n}\right)}$

d)  $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (n+k)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{n}{e}$

16) On considère la fonction réelle  $f$  de la variable réelle  $x$  définie par

$$f(x) = \int_0^x 3^{-[x]} dx \text{ où } [x] \text{ note la partie entière du réel } x$$

a)  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$  car  $x \rightarrow 3^{-[x]}$  admet une limite à droite et à gauche en tout point

b)  $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = 3 \frac{1-3^{-n}}{2}$

c) Pour montrer que  $f$  admet une limite en  $+\infty$  il est suffisant de montrer que  $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$  converge

d)  $f$  est croissante sur  $\mathbb{R}^+$  et majorée par  $\frac{1}{e \ln 3}$  donc elle admet une limite finie qui est la même que la limite de  $(f(n))_{n \in \mathbb{N}} : \frac{3}{2}$

17) On cherche à déterminer les fonctions  $g$  de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^{+*}$  et vérifiant

(P)  $\forall x > 0, g'(x) = g\left(\frac{1}{x}\right)$

a) Si  $g$  vérifie (P) alors  $g$  de classe  $C^2$  sur  $\mathbb{R}^{+*}$  et  $x^2 g'' = g$

b) Comme  $x > 0$ , on peut poser  $x = e^t$  et si  $h(t) = g(x(t))$  alors  $h'' - h' + h = 0$

c) Les fonctions  $g : x \rightarrow \sqrt{x} [A \cos(\sqrt{3} \ln x) + B \sin(\sqrt{3} \ln x)]$

où  $(A, B) \in \mathbb{R}^2$  vérifient (P)

d) Comme l'équation différentielle (P) est du second ordre et homogène l'ensemble des solutions forment un espace vectoriel de dimension 2

18) Si  $c > 0$ , on cherche à résoudre l'équation aux dérivées partielles (E):  $c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$  où  $f$  est une fonction de  $\mathbb{R}^2$  à valeurs réelle admettant des dérivées partielles secondes. On posera  $u(x, y) = x + cy$  et  $v(x, y) = x - cy$ . On notera  $g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$

a)  $\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot c$

b)  $\frac{\partial g}{\partial v} = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial y}$

c)  $\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = \frac{1}{4c^2} \left[ c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right]$

d)  $(x, y) \rightarrow e^x ch(cy) + 2$  est une solution de (E)

19) On considère le domaine

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1 \text{ et } x^2 + y^2 - 2y > 0\}$$

dont on veut calculer l'aire  $A_D$

Si on note  $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) \rightarrow (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{matrix}$

a)  $\varphi^{-1}(D) = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, 2 \sin \theta < \rho \leq 1\}$



$$b) \varphi^{-1}(D) = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, 2 \sin \theta \leq \rho \leq 1\}$$

$$c) A_D = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_{2 \sin \theta}^1 \rho d\rho d\theta = \frac{\pi}{6} + 1 - \sqrt{3}$$

$$d) A_D = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{2 \sin \theta}^1 \rho d\rho d\theta = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

20) Soient  $n$  et  $p$  deux entiers naturels non nuls et  $x$  un entier relatif non nul et non égal à 1.

a)  $\forall n \geq 1, x^{n-1} - 1$  et  $x$  sont premiers entre eux en utilisant le théorème de Bezout

b)  $\forall n \geq 2, p$  divise  $x^2 - x \iff p$  divise  $x^n - x$  car si  $p$  divise un produit  $ab$  il divise  $a$  ou  $b$  (avec  $a, b$  entiers naturels)

On cherche l'ensemble  $U$  des entiers relatifs  $x$  tels que  $\forall n \geq 2, 6$  divise  $x^n - x$

$$c) U \subsetneq \{6k, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{1 + 6k, k \in \mathbb{Z}\}$$

$$d) U = \{6k, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{1 + 6k, k \in \mathbb{Z}\}$$

21) Soit  $E$  un ensemble à  $n$  éléments ( $n \in \mathbb{N}^*$ ). On va dénombrer des parties de  $E$ ,  $(X, Y, Z)$  sur lesquelles on posera certaines contraintes:

a) Le nombre de couples  $(X, Y)$  tels que  $X \cap Y = \emptyset$  est  $3^n$

b) Le nombre de couples  $(X, Y)$  tels que  $X \cup Y = E$  est  $3^n$

c) Le nombre de couples  $(X, Y)$  tels que  $(X, Y)$  forment une partition de  $E$  est  $3^n$

d) Le nombre de triplets  $(X, Y, Z)$  tels que  $X \cup Y = Z$  est  $3^n$

22) A propos des structures

a) L'ensemble des polynômes de degrés égaux à  $n$  ( $n > 1$ ) pour l'addition usuelle des polynômes est un groupe

b) L'ensembles des matrices carrés de taille  $n$  ( $n > 1$ ) pour la multiplication usuelle des matrices est un corps

c) L'ensemble des suites convergeant vers 0 pour la multiplication usuelle des suites est un groupe

d) Si  $G$  est un groupe pour une loi  $T$  donnée et  $a \in G$ , l'ensemble  $aG = \{aTx, x \in G\}$  est un groupe pour  $T$

23) On considère  $P$  un polynôme non nul tel que  $P(X^2) - P(X+1)P(X) = 0$

a) Si  $a$  est une racine de  $P \forall n \in \mathbb{N}^*, a^{2n}$  est encore une racine de  $P$

- b) Si  $a$  est une racine de  $P \forall n \in \mathbb{N}, a^{2^n}$  est encore une racine de  $P$   
 c) Si  $a$  est une racine de  $P$ , il existe  $p$  tel que  $a = a^p$   
 d) Les racines de  $P$  sont des racines de l'unité

24) Soit  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  avec  $\forall k \in [0, n], a_k \in \mathbb{Z}$

a) Si  $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  premiers entre eux et tels que  $\frac{p}{q}$  est racine de  $P$  alors  $p$  divise  $a_0$  et  $q$  divise  $a_n$

b) Si  $2X^3 - X^2 - 13X + 5$  admet une racine rationnelle c'est nécessairement  $1, 5, \frac{1}{2}$  ou  $\frac{5}{2}$

c)  $2X^4 + X^2 + 5X + 5$  admet une racine rationnelle

d) Si  $P = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$  avec  $\forall k \in [1, n-1], a_k \in \mathbb{Z}$  alors si  $P$  possède une racine rationnelle elle sera entière.

25) Les polynômes de Tchebychev  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifient

$$T_n(\cos \theta) = \cos n\theta, \forall \theta \in \mathbb{R}$$

a)  $\cos n\theta = \operatorname{Re}(e^{in\theta}) = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k} (\cos \theta)^{n-2k} (1 - \cos^2 \theta)^k, \forall \theta \in \mathbb{R}$  donc

$(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  existe et peut être choisie à coefficients entiers

b) Si  $T_n$  et  $\tilde{T}_n$  sont deux polynômes de Tchebychev alors ils sont égaux car  $\forall x \in [-1, 1], T_n(x) = \tilde{T}_n(x)$  et  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est unique

c)  $\forall n \in \mathbb{N}^*, T_{n+1} = 2T_n - X^2 T_{n-1}$  puisque  $\cos[(n+1)\theta] = 2\cos(n\theta) - \cos^2 \theta \cos[(n-1)\theta]$

d)  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \deg(T_n) = n$  et  $\exists Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X], T_n = X^n + Q$

26) racines multiples

a)  $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\}, P_n(X) = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$  possède au moins une racine multiple car  $P'_n = P_{n-1}$

b)  $\forall n \in \mathbb{N}, P_n(X) = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$  est l'unique polynôme vérifiant  $P_n - P'_n = \frac{X^n}{n!}$

c)  $\forall n \in \mathbb{N}^*, nX^{n+2} - (n+2)X^{n+1} + (n+2)X - n$  admet 1 comme racine double

d) Si  $m$  est divisible par  $n$  alors  $\forall a \in \mathbb{C}, X^m - a^m$  est divisible par  $X^n - a^n$

27) On se place dans  $E$  l'espace vectoriel des fonctions de  $\mathbb{R}^*$  dans  $\mathbb{R}^*$

- a)  $\forall n \in \mathbb{N}, (1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx)$  est une famille libre  
 b)  $\forall n \in \mathbb{N}, (1, \cos x, \cos^2 x, \dots, \cos^n x)$  est une famille libre  
 c)  $(\operatorname{ch} x, \operatorname{sh} x)$  est une famille liée  
 d)  $(1, \arctan x, \arctan \frac{1}{x})$  est libre

28) Soit  $F$  et  $G$  deux sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel  $E$

a) Supposons l'existence d'un  $x \in F$  et  $x \notin G$ , alors

$\forall g \in G, F \cup G$  sous espace vectoriel de  $E \implies x + g \in F$

b) Si la réponse de la question a) si elle est vraie entraîne que  $F \cup G$  ne peut être un sous espace vectoriel de  $E$

c)  $F \cup G$  ne peut être un sous espace vectoriel de  $E$  que si  $F \subset G$

d) Si  $F \subset G$  alors  $F \cup G$  sous espace vectoriel de  $E$

29) Soit  $H$  et  $K$  deux sous espaces vectoriels supplémentaires d'un espace vectoriel  $E$  de dimension finie. Soit  $(e_1, \dots, e_k)$  une base de  $K$  et  $a \in H$

a)  $\operatorname{Dim}(\operatorname{vect}(e_1 + a, \dots, e_k + a)) < k$

b)  $\operatorname{vect}(e_1 + a, \dots, e_k + a)$  est supplémentaire à  $H$

c)  $\operatorname{vect}(e_1 + a, \dots, e_k + a) = K$

d) On peut montrer ici que tout sous espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie admet au moins deux supplémentaires

30)  $E$  est un espace vectoriel de dimension finie.  $f \in L(E)$ , ensemble des endomorphismes de  $E$ .

Les conditions suivantes sont équivalentes à  $\ker f \oplus \operatorname{Im} f = E$

a)  $\ker f \subset \ker f^2$

b)  $\operatorname{Im} f \subset \operatorname{Im} f^2$

c)  $\ker f \cap \operatorname{Im} f = \emptyset$

d)  $f^2 = f$  ( $f$  est un projecteur)

31)  $E$  est un espace vectoriel de dimension finie.  $f \in L(E)$ , tel que

$\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, f \circ f \circ \dots \circ f = f^n = 0$  et  $f^{n-1} \neq 0$

a)  $\forall x \in E, (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$  est libre

b) Si  $g \in L(E), \min \{p \in \mathbb{N}, g^p = 0\} \leq \dim E$

On supposera pour les deux questions suivantes que  $n = \dim E$

c)  $\ker f = \operatorname{Vect} \{f^{n-1}(x)\}$  où  $x$  est tel que  $f^{n-1}(x) \neq 0$

d)  $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect} \{x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-2}(x)\}$  où  $x$  est tel que  $f^{n-1}(x) \neq 0$

32) Soit  $(M, N) \in (M_n(\mathbb{R}))^2$  espace vectoriel des matrices carrées de tailles  $n$  telles que  $\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, M(i, j) = 1$  et  $N(i, i) = 3, N(i, j) = 1$  si  $i \neq j$

- a)  $\dim(\ker M) = n^2 - 1$  et  $M$  inversible si et seulement si  $n = 1$   
 b)  $M^p = n^{p-1}M, \forall p \in \mathbb{N}^*$   
 c)  $N^p = n^{p-1}2^p M, \forall p \in \mathbb{N}^*$   
 d)  $N^p = \left[ \frac{(3n-2)^p}{n} - (-2)^p \right] M$

33) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On se place dans  $IR_n[X]$  espace vectoriel des polynômes de degrés inférieurs ou égaux à  $n$

- a)  $\dim IR_n[X] = n$   
 b)  $\forall a \in IR, B_a = (1, X-a, (X-a)^2, \dots, (X-a)^n)$  est une base de  $R_n[X]$  et d'ailleurs  $B_0$  en est la base canonique  
 c) La matrice de passage de  $B_a$  à  $B_0$  est la matrice  $\left( a^{k-p} \binom{k}{p} \right)_{(k,p) \in [1,n]^2}$   
 d) La matrice de passage de  $B_0$  à  $B_a$  est la matrice  $\left( a^{k-p} \binom{k}{p} \right)_{(k,p) \in [1,n]^2}$

34) Soit  $f : M_n(IR) \rightarrow IR$  et vérifiant  $f(AB) = f(A)f(B), \forall (A, B) \in (M_n(IR))^2$

- a)  $f$  est un morphisme de groupe pour  $M_n(IR)$  muni de la multiplication usuelle des matrices  
 b)  $f(O_n) = 0$  et  $f(I_n) = 1$  ( $O_n$  est la matrice nulle de  $M_n(IR)$  et  $I_n$  la matrice identité)  
 c) Si  $\exists p \in \mathbb{N}, A^p = 0$  alors  $f(A) = 0$   
 On rappelle que si  $r = \text{rang} A < n$ ,  
 $\exists J_r \in M_n(IR)$ , telle que  $J^{n-r} = O_n, (P, Q) \in [M_n(IR)]^2$  inversible telles que  $A = PJ_rQ$   
 d)  $A$  inversible  $\Leftrightarrow f(A) \neq 0$

35)  $E$  est un espace vectoriel euclidien de dimension 3 dont une base est  $B$  et dont on note le produit scalaire  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . On note  $u = (a, b, c)_B$  un vecteur normé fixé de  $E$  et  $a$  un scalaire. On définit  $f_a$  par  $\forall x \in E, f(x) = x + a \langle x, u \rangle u$

- a)  $f_a$  est un automorphisme orthogonal si et seulement si  $a = -2$   
 b)  $f_2$  est un automorphisme orthogonal  
 c)  $f_{-2}$  est la symétrie orthogonale par rapport au plan vectoriel orthogonal à  $u$   
 d)  $f_2$  est la symétrie orthogonale par rapport à la droite vectorielle engendrée par  $u$

36) L'espace  $\mathbf{E}$  est rapporté à un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . L'espace vectoriel associé  $E$  est rapporté à la base  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Soit  $D$  la droite de  $\mathbf{E}$  dont la représentation paramétrique est donné par :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

a) Les coordonnées du point symétrique de  $M(a, b, c)$  par rapport à  $D$  sont  $(1 + \frac{a-2b+c}{6}, 1 - \frac{a-2b+c}{3}, 1 + \frac{a-2b+c}{6})$

b) Les coordonnées du point symétrique de  $M(a, b, c)$  par rapport à  $D$  sont  $(\frac{6-2a-2b+c}{3}, \frac{6-2a+b-2c}{3}, \frac{6-2a-2b+c}{3})$

c) La droite symétrique par rapport à  $D$  de l'axe  $(z'oz)$  à pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$$

d) La droite symétrique par rapport à  $D$  de l'axe  $(z'oz)$  à pour équations cartésiennes :

$$\begin{cases} 6 - 2x - y = 0 \\ y = z \end{cases}$$