



CONCOURS CENTRALE-SUPÉLEC

Mathématiques 2

PSI

2022

4 heures

Calculatrice autorisée

Objectif

Ce problème propose d'étudier quelques propriétés d'un *opérateur intégral* U défini sur un espace préhilbertien réel E . Cet espace et son produit scalaire sont introduits dans la partie II et l'opérateur U est étudié dans la partie III. Dans la partie IV, on s'intéresse à l'étude d'une famille d'équations différentielles à un paramètre pour lesquelles on recherche des solutions développables en séries entières. Enfin, la partie V fait le lien entre les vecteurs propres de l'endomorphisme U et les solutions des équations différentielles trouvées dans de la partie IV.

Liens entre les différentes parties

- Les parties I et II sont très largement indépendantes à l'exception de la définition de la fonction k_x .
- La partie III utilise les résultats de la partie II ainsi que la condition d'appartenance à E établie dans la partie I.
- La partie IV fait ponctuellement appel à l'espace E défini et étudié dans les parties I et II. Elle est indépendante de la partie III.
- La partie V utilise les résultats des parties III et IV ainsi que le résultat de la question 3.

Notations

On note E l'ensemble des fonctions f continues de \mathbb{R}_+^* dans \mathbb{R} telles que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f^2(t) \frac{e^{-t}}{t} dt$ converge.

Pour $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, on note p_α la fonction $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto t^\alpha \end{cases}$.

I Préliminaires : étude de quelques éléments de E

I.A – Des fonctions de E utiles pour la suite

- Q 1.** Montrer que, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, p_α appartient à E .
- Q 2.** Soit P une fonction polynomiale non identiquement nulle à coefficients réels. Montrer que la restriction de P à \mathbb{R}_+^* appartient à E si et seulement si $P(0) = 0$.
- Q 3.** Soient a et b deux nombres réels. Montrer que la fonction $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto ae^t + b \end{cases}$ appartient à E si et seulement si $a = b = 0$.
- Q 4.** Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto (e^t - 1)^2 \frac{e^{-t}}{t} \end{cases}$ est intégrable sur $]0, x]$.
- Q 5.** Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ et tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, on note $k_x(t) = e^{\min(x,t)} - 1$ où $\min(x, t)$ désigne le plus petit des réels x et t . Représenter graphiquement la fonction k_x . Montrer que k_x appartient à E .

I.B – Une condition suffisante d'appartenance à E

Dans cette sous-partie, on suppose que f est une fonction de \mathbb{R}_+^* dans \mathbb{R} de classe \mathcal{C}^1 vérifiant

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \\ \exists C > 0 ; \forall x > 0, |f'(x)| \leq C \frac{e^{x/2}}{\sqrt{x}}. \end{cases}$$

- Q 6.** Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on pose $\Phi(x) = \frac{4\sqrt{x}e^{x/2}}{1+x} - \int_0^x \frac{e^{t/2}}{\sqrt{t}} dt$. Montrer que Φ est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* , que $\lim_{x \rightarrow 0} \Phi(x) = 0$ et que, pour tout $x > 0$, $\Phi'(x) \geq 0$. En déduire que $\Phi(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.
- Q 7.** Montrer que, pour tout $x > 0$, $|f(x)| \leq 4C \frac{\sqrt{x}e^{x/2}}{1+x}$.
- Q 8.** En déduire que $f \in E$.

II Structure préhilbertienne de E

Q 9. Montrer que, si f et g sont deux fonctions de E , alors l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)g(t) \frac{e^{-t}}{t} dt$ est absolument convergente.

Q 10. En déduire que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathcal{C}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ des fonctions continues sur \mathbb{R}_+^* à valeurs dans \mathbb{R} .

Pour toutes fonctions $f \in E$ et $g \in E$, on pose, $\langle f | g \rangle = \int_0^{+\infty} f(t)g(t) \frac{e^{-t}}{t} dt$.

Q 11. Montrer que l'on définit ainsi un produit scalaire sur E .

La norme $\|\cdot\|$ associée à ce produit scalaire est donc définie pour toute fonction $f \in E$ par

$$\|f\| = \left(\int_0^{+\infty} f^2(t) \frac{e^{-t}}{t} dt \right)^{1/2}.$$

Q 12. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \|k_x\| = 0$. On rappelle que, pour tout $x > 0$, $k_x(t) = e^{\min(x,t)} - 1$.

Q 13. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\int_0^{+\infty} t^k e^{-t} dt = k!$.

Q 14. On rappelle que les fonctions p_α ont été définies dans les notations en tête de sujet. La famille $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle une famille orthogonale de E ?

III Un opérateur sur E

À chaque fonction $f \in E$, on associe la fonction $U(f)$ définie pour tout $x > 0$ par

$$U(f)(x) = \langle k_x | f \rangle = \int_0^{+\infty} (e^{\min(x,t)} - 1) f(t) \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

III.A –

Q 15. À l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que pour toute fonction $f \in E$,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} U(f)(x) = 0.$$

Q 16. Montrer que pour toute fonction $f \in E$ et pour tout $x > 0$,

$$U(f)(x) = \int_0^x (1 - e^{-t}) \frac{f(t)}{t} dt + (e^x - 1) \int_x^{+\infty} f(t) \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

Q 17. Soit $f \in E$. Montrer que $U(f)$ est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* et vérifie, pour tout $x > 0$,

$$(U(f))'(x) = e^x \int_x^{+\infty} f(t) \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

Dans la suite, pour alléger les notations, la dérivée de la fonction $U(f)$ est notée $U(f)'$.

Q 18. Soit $f \in E$. Montrer que $U(f)$ est de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R}_+^* et que la fonction $U(f)$ est solution sur \mathbb{R}_+^* de l'équation différentielle

$$y'' - y' = -\frac{f(x)}{x}. \quad (\text{III.1})$$

Q 19. Montrer que pour tout $f \in E$ et pour tout $x > 0$,

$$|U(f)'(x)| \leq e^x \|f\| \left(\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt \right)^{1/2} \leq \|f\| \frac{e^{x/2}}{\sqrt{x}}.$$

Q 20. Dédurre de ce qui précède que U est un endomorphisme de E et que, pour tout $f \in E$ et tout $x > 0$,

$$|U(f)(x)| \leq 4\|f\| \frac{\sqrt{x} e^{x/2}}{1+x}$$

Q 21. En déduire que

$$\|U(f)\| \leq 4\|f\|.$$

Q 22. Montrer que U est injectif.

Q 23. L'endomorphisme U est-il surjectif ?

III.B – On fixe deux fonctions f et g de E . Pour $x > 0$, on pose

$$F(x) = -U(f)'(x)e^{-x}.$$

Q 24. Vérifier que F est une primitive de $x \mapsto f(x) \frac{e^{-x}}{x}$ sur l'intervalle \mathbb{R}_+^* .

Q 25. Montrer que pour tout $x > 0$, $|F(x)U(g)(x)| \leq \frac{4\|f\|\|g\|}{1+x}$.

Q 26. Montrer que pour tout $x \in]0, 1]$, $|F(x)| \leq \|f\|(e^{-1} - \ln(x))^{1/2}$.
On pourra utiliser la question 19.

Q 27. Montrer l'existence et calculer les valeurs des limites en 0 et en $+\infty$ de la fonction $t \mapsto F(t)U(g)(t)$.

Q 28. Montrer que $\langle f | U(g) \rangle = \int_0^{+\infty} U(f)'(t)U(g)'(t)e^{-t} dt$.

Q 29. En déduire que $\langle f | U(g) \rangle = \langle U(f) | g \rangle$.

IV Solutions d'une équation différentielle développables en série entière

Pour $p \in \mathbb{R}^*$ on note (E_p) l'équation différentielle sur \mathbb{R}_+^*

$$(E_p) : x(y'' - y') + py = 0.$$

Q 30. Soient $p \in \mathbb{R}^*$ et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. On suppose que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ a un rayon de convergence infini. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est solution de (E_p) si et seulement si

$$\begin{cases} a_0 = 0, \\ n(n+1)a_{n+1} = (n-p)a_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

IV.A – Recherche de solutions polynomiales

Q 31. Montrer que (E_p) possède des solutions polynomiales non identiquement nulles si et seulement si $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'alors, les solutions polynomiales non nulles de (E_p) sont de degré p et appartiennent à l'espace vectoriel E .

On ne demande pas de déterminer explicitement les solutions polynomiales lorsqu'elles existent.

Dans la suite de cette sous-partie, on fixe $p \in \mathbb{N}^*$ et on considère un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que la fonction polynomiale $x \mapsto P(x)$ soit solution de l'équation (E_p) . L'objectif est de déterminer une expression simple de P en fonction du paramètre p .

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on note $h(x) = e^{-x}P(x)$.

Q 32. Montrer que la fonction h est solution de l'équation différentielle $x(y'' + y') + py = 0$ sur \mathbb{R}_+^* .

Q 33. Justifier que la fonction h est développable en série entière sur \mathbb{R} .

On note $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des coefficients du développement en série entière de h . Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$. On peut montrer, de la même façon qu'à la question 30 (cette démonstration n'est pas demandée), que ces coefficients vérifient

$$\begin{cases} b_0 = 0, \\ n(n+1)b_{n+1} = -(n+p)b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

Q 34. Établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $b_n = \frac{(-1)^{n-1}(n+p-1)!}{p! n! (n-1)!} b_1$.

Q 35. On pose $g_p(x) = x^{p-1}e^{-x}$. Justifier que $g_p^{(p)}$ est développable en série entière et déduire de la question 34 que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$P(x) = Cxe^x g_p^{(p)}(x)$$

où C est une constante réelle dont on précisera l'expression en fonction de b_1 et de p .

IV.B – Solutions développables en séries entières non polynomiales

Dans toute cette sous-partie, on fixe un réel p non nul et on suppose que $p \notin \mathbb{N}^*$.

Q 36. Justifier l'existence de suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ non identiquement nulles telles que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$

ait un rayon de convergence infini et telles que la fonction $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ soit solution de (E_p) .

On fixe une telle série entière et on pose pour $x > 0$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Q 37. Montrer qu'il existe un entier naturel $q > p$ tel que, pour tout entier $n \geq q$,

$$|a_{n+1}| \geq \frac{|a_n|}{2(n+1)}.$$

Q 38. En déduire que, pour tout entier $n \geq q$, $|a_n| \geq \frac{q! |a_q|}{2^{n-q} n!}$.

Q 39. Montrer que la fonction $\psi : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \sum_{n=q}^{+\infty} |a_n| x^n \end{cases}$ n'est pas un élément de E .

Q 40. En déduire enfin que la fonction f n'est pas un élément de E .

V Éléments propres de U

Q 41. Le nombre réel 0 est-il valeur propre de U ?

Q 42. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$. On suppose que λ est valeur propre de U . Soit f un vecteur propre associé. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $(E_{1/\lambda})$.

On suppose que f est développable en série entière sur \mathbb{R}_+^* , c'est-à-dire qu'il existe une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence infini telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Q 43. Montrer que les seules valeurs propres possibles de U sont de la forme $\lambda = 1/p$ avec $p \in \mathbb{N}^*$.

Q 44. Soit P une solution polynomiale non nulle de (E_p) . Démontrer que la fonction $pU(P) - P$ vérifie sur \mathbb{R}_+^* l'équation différentielle $y'' - y' = 0$.

Q 45. Montrer que P est un vecteur propre de U pour la valeur propre $1/p$.

Q 46. Pour tout entier $p \in \mathbb{N}^*$ et tout $x > 0$, on pose $P_p(x) = xe^x g_p^{(p)}(x)$, où $g_p(x) = x^{p-1}e^{-x}$. On rappelle que P_p est une fonction polynomiale de degré p et que $P_p \in E$. Montrer que les polynômes P_p sont deux à deux orthogonaux dans E .

• • • FIN • • •
