



CONCOURS CENTRALE-SUPÉLEC

# Mathématiques 1

PC

2023

4 heures

Calculatrice autorisée

L'objectif de ce sujet est d'établir le théorème de Perron-Frobenius pour une certaine classe de matrices symétriques. Ce théorème étudie les espaces propres d'une matrice associés aux valeurs propres de module maximal. Une application, en conclusion, montre une ouverture à l'analyse spectrale des matrices à coefficients positifs.

- La partie I permet d'obtenir des résultats préliminaires, utiles pour les parties suivantes.
- La partie II examine, à titre d'exemple, le cas des matrices à coefficients strictement positifs de taille deux.
- La partie III s'intéresse au lien entre le rayon spectral d'une matrice et le comportement asymptotique de la suite de ses puissances successives ; elle est indépendante de la partie II.
- La partie IV donne une démonstration du théorème pour une classe de matrices symétriques à coefficients positifs ; elle est indépendante des parties II et III.

## Notations et définitions

$\mathbb{K}$  désigne l'ensemble  $\mathbb{R}$  des réels ou l'ensemble  $\mathbb{C}$  des complexes.

Soit  $n$  et  $p$  deux entiers naturels non nuls.

- On note  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices à  $n$  lignes et  $p$  colonnes à coefficients dans  $\mathbb{K}$  et  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ .
- Si  $A = (A_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$  est une matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ , on note  $|A|$  la matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  dont les coefficients sont  $|A_{ij}|$  ( $1 \leq i \leq n$  et  $1 \leq j \leq p$ ).
- Une matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  est dite positive (respectivement strictement positive) lorsque tous ses coefficients sont positifs ou nuls (respectivement strictement positifs). La notation  $A \geq 0$  (respectivement  $A > 0$ ) signifie que la matrice  $A$  est positive (respectivement strictement positive).
- Si  $A$  et  $B$  sont deux matrices de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ , la notation  $A \geq B$  (respectivement  $A > B$ ) signifie que la matrice  $A - B$  est positive (respectivement strictement positive). De même, la notation  $A \leq B$  (respectivement  $A < B$ ) signifie que la matrice  $B - A$  est positive (respectivement strictement positive).
- Les propriétés suivantes pourront être librement utilisées (sous réserve que les opérations correspondantes puissent être envisagées) :
  - $|A + B| \leq |A| + |B|$  ;
  - $|A^\top| = |A|^\top$  ;
  - si  $\gamma \in \mathbb{K}$ , alors  $|\gamma A| = |\gamma| |A|$  ;
  - si  $A \geq 0$  et  $B \geq 0$ , alors  $AB \geq 0$ .
- On rappelle que le produit scalaire canonique de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  est défini, pour tous vecteurs  $X$  et  $Y$  de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ , par

$$(X | Y) = X^\top Y = \sum_{k=1}^n X_k Y_k, \quad \text{où } X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} \text{ et } Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}.$$

La norme euclidienne (associée à ce produit scalaire) du vecteur  $X$  est alors donnée par

$$\|X\| = \sqrt{X^\top X} = \left( \sum_{k=1}^n X_k^2 \right)^{1/2}.$$

- Le spectre d'une matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est noté  $\text{sp}(A)$ .
- Le rayon spectral d'une matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , de spectre non vide, est le réel positif ou nul, noté  $\rho(A)$ , défini par

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| \mid \lambda \in \text{sp}(A)\}.$$

- On dit qu'une norme  $N : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{R}$  est sous-multiplicative si, pour toutes matrices  $A$  et  $B$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,

$$N(AB) \leq N(A)N(B).$$

## I Résultats préliminaires

**Q 1.** Soit  $n$  un entier naturel,  $A$  et  $B$  deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $X$  un vecteur de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ . Montrer que

$$\text{si } A > 0, X \geq 0 \text{ et } X \neq 0, \text{ alors } AX > 0,$$

et que

$$|AB| \leq |A||B|.$$

**Q 2.** Rappeler l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour deux vecteurs  $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$  et  $Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}$  de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ .

En déduire que si  $n$  est un entier naturel et  $z_1, \dots, z_n, w_1, \dots, w_n$  sont des nombres complexes, alors

$$\sum_{k=1}^n |z_k| |w_k| \leq \left( \sum_{k=1}^n |z_k|^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{k=1}^n |w_k|^2 \right)^{1/2}.$$

**Q 3.** Soit  $z$  un nombre complexe tel que  $|1+z| = 1+|z|$ . Montrer que  $z \in \mathbb{R}_+$ . En déduire que, si  $z$  et  $z'$  sont deux nombres complexes vérifiant  $|z+z'| = |z|+|z'|$  et  $z \neq 0$ , alors

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}_+ \mid z' = \alpha z.$$

**Q 4.** Soit  $n$  un entier supérieur ou égal à 2 et  $z_1, \dots, z_n$  des nombres complexes non tous nuls tels que

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| = \sum_{k=1}^n |z_k|.$$

Montrer que

$$\exists \theta \in \mathbb{R} \mid \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, z_k = e^{i\theta} |z_k|.$$

Dans le cas où  $z_1 \neq 0$ , on pourra appliquer le résultat de la question précédente aux couples  $(z_1, z_k)$  pour  $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$ .

## II Matrices strictement positives de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Soit  $a, b, c$  et  $d$  des nombres réels strictement positifs et  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ .

**Q 5.** Exprimer le discriminant  $\Delta$  du polynôme caractéristique de  $A$  en fonction de  $a, b, c$  et  $d$ .

**Q 6.** Montrer que  $\Delta > 0$ . En déduire qu'il existe deux réels  $\lambda$  et  $\mu$ , vérifiant  $\lambda < \mu$ , tels que  $A$  soit semblable à la matrice  $\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ .

**Q 7.** Montrer que  $|\lambda| < \mu$ .

**Q 8.** Montrer que la suite  $(A^k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  converge vers une matrice  $L$  non nulle si et seulement si  $\mu = 1$ . En cas de convergence, préciser le rang de  $L$  puis montrer que  $L$  est la matrice d'un projecteur de  $\mathbb{R}^2$ .

**Q 9.** Soit  $\alpha$  et  $\beta$  deux réels de  $]0, 1[$  et  $B$  la matrice  $\begin{pmatrix} 1-\alpha & \beta \\ \alpha & 1-\beta \end{pmatrix}$ . Montrer que  $B$  est semblable à la matrice  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-\alpha-\beta \end{pmatrix}$  et donner une matrice  $S$  de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , inversible, telle que  $B = SDS^{-1}$ .

**Q 10.** En déduire que la suite  $(B^k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  converge vers une matrice  $\Lambda$  que l'on explicitera.

## III Normes sous-multiplicatives sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ; rayon spectral

### III.A – Exemples de normes sous-multiplicatives sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Pour toute matrice  $A = (A_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , on pose

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \left( \sum_{j=1}^n |A_{ij}| \right) \quad \text{et} \quad \|A\|_2 = \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |A_{ij}|^2 \right)^{1/2}.$$

**Q 11.** Montrer que  $\|\cdot\|_\infty$  est une norme sous-multiplicative sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

**Q 12.** On admet que  $\|\cdot\|_2$  est une norme sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  ; montrer que cette norme est sous-multiplicative.

**Q 13.** Soit  $N$  une norme sous-multiplicative sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  et  $S$  une matrice inversible de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Montrer que l'on définit une norme sous-multiplicative  $\nu$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  en posant  $\nu(A) = N(S^{-1}AS)$  pour toute  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

### III.B – Rayon spectral

Soit  $n$  un entier supérieur ou égal à 2 et  $A$  une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

#### III.B.1)

**Q 14.** Soit  $S$  une matrice inversible de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Comparer  $\rho(A)$  et  $\rho(S^{-1}AS)$ .

**Q 15.** Justifier que  $A$  est trigonalisable. Comparer, pour  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\rho(A^k)$  et  $\rho(A)^k$  et, pour  $\alpha \in \mathbb{C}$ ,  $\rho(\alpha A)$  et  $\rho(A)$ .

**Q 16.** Montrer que, pour toute norme  $N$  sous-multiplicative sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , on a  $\rho(A) \leq N(A)$ .

On pourra fixer une valeur propre  $\lambda$  de  $A$  et mettre en évidence une matrice  $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , non nulle, telle que  $AH = \lambda H$ .

#### III.B.2)

Le but de cette section est de montrer que, pour tout réel strictement positif  $\varepsilon > 0$ , il existe une norme  $N$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , sous-multiplicative (dépendant de  $A$  et de  $\varepsilon$ ), telle que

$$N(A) \leq \rho(A) + \varepsilon.$$

À cette fin, on introduit, pour tout réel strictement positif  $\tau$ , la matrice diagonale

$$D_\tau = \text{diag}(1, \tau, \dots, \tau^{n-1})$$

et on considère une matrice  $T$  triangulaire supérieure de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

**Q 17.** Calculer le produit  $D_\tau^{-1}TD_\tau$  en précisant, pour tout  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ , l'expression du coefficient en position  $(i, j)$  de la matrice  $D_\tau^{-1}TD_\tau$  en fonction de  $\tau$  et des coefficients de la matrice  $T$ .

**Q 18.** Montrer qu'il existe  $\delta > 0$  tel que, pour tout  $\tau \in \mathbb{R}$  vérifiant  $|\tau| \leq \delta$ , on a  $\|D_\tau^{-1}TD_\tau\|_\infty \leq \rho(T) + \varepsilon$ .

**Q 19.** Conclure.

#### III.B.3)

**Q 20.** Utiliser ce qui précède pour montrer que la suite  $(A^k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  converge vers la matrice nulle si et seulement si  $\rho(A) < 1$ .

## IV Théorème de Perron-Frobenius pour une classe de matrices symétriques positives

Soit  $n$  un entier supérieur ou égal à 2 et  $A$  une matrice non nulle de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , symétrique et positive (c'est-à-dire à coefficients positifs ou nuls). On pose  $r = \rho(A)$ .

### IV.A –

**Q 21.** Justifier que  $A$  est diagonalisable sur  $\mathbb{R}$ . Que peut-on dire des sous-espaces propres de  $A$  ?

**Q 22.** Montrer que  $r > 0$ .

On note  $\mu$  la plus grande valeur propre de  $A$ .

**Q 23.** Montrer que, pour tout vecteur  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ , unitaire pour la norme euclidienne canonique,

$$X^\top AX \leq \mu.$$

On pourra faire le calcul dans une base orthonormée convenablement choisie.

**Q 24.** Montrer que cette inégalité est une égalité si, et seulement si,  $X$  est un vecteur propre de  $A$  associé à la valeur propre  $\mu$ .

**Q 25.** Montrer que, pour tout vecteur unitaire  $X$ ,

$$|X^\top AX| \leq |X|^\top |X| \leq \mu.$$

**Q 26.** En déduire que, pour toute valeur propre  $\lambda$  de  $A$ , on a  $|\lambda| \leq \mu$ , et que  $\mu = r$ .

### IV.B –

Dans cette sous-partie uniquement, on suppose en outre que  $A$  est strictement positive.

**Q 27.** Montrer que, si  $X$  est un vecteur propre de  $A$ , unitaire, associé à la valeur propre  $r$ , alors  $|X|$  est un vecteur propre de  $A$ , unitaire, associé à la valeur propre  $r$ , et que  $|X| > 0$ .

**Q 28.** Montrer que  $X = |X|$  ou  $X = -|X|$ .

**Q 29.** Montrer que le sous-espace propre  $\ker(A - rI_n)$  est de dimension 1.

On pourra raisonner par l'absurde en considérant deux vecteurs propres de  $A$  orthogonaux associés à  $r$ .

**Q 30.** Montrer que la multiplicité de  $r$ , en tant que valeur propre, vaut 1 et en déduire que  $-r$  n'est pas valeur propre de  $A$ .

Ainsi,  $r$  est l'unique valeur propre de  $A$  de module égal à  $r$ .

**Q 31.** Montrer que cette propriété n'est pas forcément vérifiée si  $A$  est seulement supposée positive.

On pourra chercher des exemples dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .

**IV.C –**

On suppose dans cette sous-partie qu'il existe un entier  $p \geq 2$  tel que  $A^p$  est strictement positive.

D'après la question 26,  $r$  est une valeur propre de  $A$ .

**Q 32.** Montrer que l'espace propre  $\ker(A - rI_n)$  est de dimension 1, engendré par un vecteur strictement positif.

**Q 33.** Montrer que  $r$  est l'unique valeur propre de  $A$  de module égal à  $r$ .

On pourra distinguer deux cas suivant la parité de  $p$ .

**IV.D – Une application : un théorème de Ky Fan**

On admet que les résultats obtenus pour les matrices symétriques strictement positives, ou positives admettant une puissance strictement positive, restent vrais pour une matrice strictement positive. Ainsi, si  $B$  est une matrice strictement positive, alors  $\rho(B)$  est l'unique valeur propre de  $B$  de module maximal, elle est de multiplicité 1 en tant que valeur propre et son espace propre est de dimension 1.

Soit  $A = (A_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  une matrice quelconque de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  et  $B = (B_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  une matrice strictement positive de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

**Q 34.** Montrer que

$$\text{sp}(A) \subset \bigcup_{i=1}^n \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z - A_{ii}| \leq \sum_{j=1, j \neq i}^n |A_{ij}| \right\}.$$

On suppose que, pour tout couple  $(i, j) \in [1, n]^2$  tel que  $i \neq j$ , on a  $|A_{ij}| \leq B_{ij}$ .

**Q 35.** Montrer que

$$\text{sp}(A) \subset \bigcup_{i=1}^n \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z - A_{ii}| \leq \rho(B) - B_{ii} \right\}.$$

On pourra considérer un vecteur propre  $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$  de  $B$ , strictement positif, associé à la valeur propre  $\rho(B)$ , et utiliser la matrice  $D^{-1}AD$ , où  $D = \text{diag}(X_1, \dots, X_n)$ .

---

• • • FIN • • •

---